KIT DE PIEGEAGE

PALM*atrap*

Piège le charançon rouge du palmier *Rhynchophorus ferrugineus*

PALM*atrap* est spécialement conçu pour piéger le charançon rouge du palmier ***Rhynchophorus ferrugineus***. Ce piège est l'outil de **surveillance indispensable**, complémentaire de la protection biologique des palmiers assurée par **PALMANEM®.**

Ses avantages

Structure en **pyramide et couleur adaptée à la biologie** de l'insecte
Efficacité prouvée par des organismes indépendants
Esthétique et discret, **PALM*atrap*** se fond dans le décor
PALM*atrap* ne s'enterre pas et s'utilise sans eau
Phéromone d'agrégation de qualité reconnue
Piège **les individus mâles et les femelles**

S'utilise sans eau et ne s'enterre pas !
INSTALLATION RAPIDE et TRES PEU DE MAINTENANCE

Informations importantes

Dans **l'arrêté du 21 juillet 2010** (JO) relatif à la lutte contre *Rhynchophorus ferrugineus*, il est stipulé que la lutte contre le charançon rouge et sa surveillance sont obligatoires sur tout le territoire français.

Instructions de montage

Ce Kit contient :

- Un piège conique noir spécifique du charançon rouge
- Un récipient noir et 4 brides de fixation
- Un diffuseur de phéromone d'agrégation
- Un mode d'emploi

1. Suspendre la phéromone au crochet prévu à cet effet, puis fixer le tout à la pyramide – les deux éléments se clipsent aisément
2. Placer dans le récipient noir des débris de palmiers et éventuellement une pierre afin d'assurer la stabilité du piège dans les régions ventées
3. Fixer le récipient noir à la pyramide avec les 4 brides fournies selon le schéma indiqué ⇨



Votre piège est prêt à l'emploi……

KOPPERT BIOLOGICAL SYSTEMS

PALM*atrap* / PALMANEM®

L'association optimale pour la protection de vos palmiers

Mode d'emploi

	Niveau faible **Région sans palmiers infestés à moins de 10 km**	**Niveau élevé** **Palmiers infestés à proximité**
Implantation sur de grandes surfaces > 1ha (pépiniéristes, communes)	2 pièges / ha	4 à 6 pièges / ha
Implantation sur de petites et moyennes surfaces < 1ha (maisons particulières)	1 à 2 pièges	2 à 6 pièges

Placer les pièges **en périphérie de la zone plantée de palmier**, avec une distance minimale de **50 mètres entre chaque piège**.

Ne pas placer les pièges trop près des palmiers - respecter une distance minimale de 20 m avec le palmier le plus proche (dans la mesure du possible).

En cas de doute, contactez votre distributeur qui vous donnera les conseils adaptés à votre situation.

Durée de vie et conservation de l'attractif

La phéromone est à remplacer tous les 90 jours (3 mois environ). Elle doit être conservée au réfrigérateur avant son utilisation et peut être conservée au congélateur sur des durées plus longues. Une kairomone (attractif alimentaire) peut éventuellement être ajoutée au dispositif.

Porter des gants lors de la manipulation de l'attractif.

Contactez votre distributeur le plus proche

Piège PALM*atrap*
Code produit : 08007

+

Phéromone d'agrégation
Code produit : 08025

Kit piégeage complet PALM*atrap*

KOPPERT BIOLOGICAL SYSTEMS

Koppert France - 147 Avenue des Banquets 84300 Cavaillon
Tél : 04 90 78 30 13 – Fax : 04 90 78 25 98 – info@koppert.fr